

## Vejledning til forældre



### **Fjernelse af polyper**

Operation .....dag den / kl.

Kontrol .....dag den / kl.

Øre, Næse og Halsklinikken Vesterbro v/  
Speciallæge Ann-Louise Reventlow-Mourier  
Vesterbrogade 82, 3. Sal  
1620 København V  
Telefon 33314330

[www.orelaegen-vesterbro.dk](http://www.orelaegen-vesterbro.dk)

### **Fjernelse af polypper - hvorfor?**

Man fjerner polypper for at skabe bedre plads i næse svælget.

Herved reduceres risikoen for væske på ørene, ligesom snorken og natlige vejrtrækningspauser begrænses.

Det er lægen der under den eller de indledende undersøgelser afgør, om der er behov for fjernelse af polypper.

### **Fjernelse af polypper – hvordan?**

Polypper er lokaliseret i svælget oppe bag ganen og fjernes gennem munden.

Fjernelse af polypper kræver en kortvarig fuld bedøvelse. Det er derfor vigtigt, at følgende fasteregler overholdes:

1: Der må ikke spises fra midnat dagen før operationen og til efter operationen.

2: De må drikkes tynde klare væsker indtil 2 timer før operationen: Klare væsker er vand, saft eller the. Der må ikke drikkes mælk eller juice.

Ved bedøvelsen anvendes kun inhalationsnarkose. Der bliver således ikke anlagt nåle/venflon. Af hensyn til barnet, bliver narkosen indledt hurtigt, og det forventes, at barnet så vidt muligt er forberedt på dette af forældrene.

### **Fjernelse af polypper - på selve dagen:**

Barnet skal være ledsaget af to voksne på operationsdagen. Der må ikke være små søskende eller andre børn med.

Ved ankomst til klinikken bedes I sørge for at barnet kommer på toiletet, med mindre det har ble på.

Pårørende følger med ind på operationsstuen og bliver der til barnet sover. Selve operationen varer ca. 15-20 minutter.

Efter operationen løftes barnet på opvågningen, og pårørende kaldes ind til barnet, mens det vågner. Man skal lade barnet ligge indtil det begynder at vågne. Opvågningssygeplejersken vil holde

øje med barnet. Barnet kan godt vågne med smerte efter operationen.

Lægen orienterer om indgrebet og forløbet og undersøger barnet inden hjemsendelse.

### **Medicin og smertestillende:**

På operationsdagen tages barnets eventuelle vanlige medicin, senest 2 timer før indgrebet sammen med paracetamol (panodil/pinex) som mixtur eller stikpille svarende til barnets alder og vægt.

Der skal være smertestillende (panodil) i hjemmet efter operation.

### **Efter operationen:**

Barnet må efter fjernelse af polypper spise kold blød kost og kolde drikke det første døgn efter operationen. Derefter kan der spises og drikkes frit.

### **Komplikation til operationen:**

Komplikationer ved operationen er primært blødning. Risiko for blødning er størst de første timer. Hvis barnets sput er med friskt blod, skal hun/han sættes op og gives isterninger. Standser blødningen herved kan man se an. Bløder det fortsat eller kaster barnet gammelt sort blod op, skal man straks kontakte vagtlæge eller skadestue.

Man kan forvente, at barnet har smerter på dagen for operationen.

Man ser nogle gange at polypperne kan vokse ud igen.

### **Kontrol:**

Vi anbefaler, at barnet holdes hjemme på dagen og dagen efter operationen.

Efter operationen er der kontrol i klinikken efter ca. 2 uger

**Er man i tvivl – kontakt vagtlæge eller skadestue!**